# Station d'Angers - Directeur-Gérant . L BOUYX 0

# DLP-3-4-71 168757 AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE:

Tel. 88-30-34

88-06-15

ABONNEMENT ANNUEL

EDITION DE LA STATION DES PAYS DE LA LOIRE ANGERS

Poste 571

(MAINE & LOIRE, LOIRE-ATLANTIQUE, SARTHE, VENDÉE, NAVENNE) Régisseur de recettes de la D. D. A. - Protection des Végétaux - Cité Administratice, rue Dupetit-Thouars . MERS

C. C. P. Nantes 86-04-02

25 1

## SUPPLEMENT Nº 1 au BULLETIN Nº 127 d'AVRIL 1971

LOIRE ATLANTIQUE, MAINE et LOIRE, VENDEE..... p. 12

### ARBRES FRUITIERS

TAVELURE DU POIRIER - Les projections d'ascospores encore peu abondantes, commencent. Toutes les variétés ont atteint un stade réceptif à la maladie. La période dangereuse débute. Il y a donc lieu d'effectuer un premier traitement dans tous les vergers de poiriers dès les premiers jours de la semaine du 5 au 10 Avril.

TAVELURE DU POMMIER - Les projections d'ascospores sont également commencées. Sur les variétés qui ont atteint le stade sensible C 3D (séparation des écailles des bourgeons et apparition du sommet des boutons floraux), un traitement doit donc être aussi réalisé dès les premiers jours de la semaine du 5 au 10 Avril.

IMPORTANT - Sur les variétés de pommiers à débourrement plus tardif attendre que le stade C 3D soit atteint pour intervenir.

Utiliser l'un des fongicides indiqué dans le Bulletin Nº 126 de Mars.

La protection contre les tavelures doit être des maintenant assurée d'une manière efficace et il est rappelé que tout traitement éliminé par les pluies doit être renouvelé immédiatement sans attendre un avis de la Station.

OIDIUM DU POMMIER - Les premiers germes sont déjà formés dans les bourgeons. On pourra donc profiter du traitement anti-tavelure pour assurer la protection contre l'oïdium sur les variétés sensibles.

PUCERONS et ARAIGNEE ROUGE - Il est encore trop tôt pour intervenir.

CLOQUE et MONILIA DU PECHER - Un traitement doit actuellement être exécuté contre ces affections avec un fongicide organique de synthèse.

GNOMONIA et MONILIA DU CERISIER - Un traitement cuprique doit être effectué dès maintenant contre ces affections.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux:

Les Contrôleurs chargés des Avertissements Agricoles:

J. DIXMERAS

R. GEOFFRION - J. BOUCHET

TIRAGE DU 1er AVRIL 1971

